

University of Groningen

## Arthrosis deformans van het kaakgewricht: een klinisch en röntgenologisch onderzoek

Boering, Geert

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1966

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Boering, G. (1966). *Arthrosis deformans van het kaakgewricht: een klinisch en röntgenologisch onderzoek*. [Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

### I

Primaire bottransplantatie bij de behandeling van cheilognathopalatoschisis is dan pas verantwoord, wanneer men in staat is bij een baby de te verwachten groei(stoornis) van de maxilla te bepalen.

### II

Bij een gecombineerde chemotherapie van tuberculose is de resistentieverhinderende werking van Isoxyl (4-4 diisoamyloxythiosemicarbanilide) twijfelachtig.

Olejníček, M., M. Weberová, M. Novák  
en E. Jancík: Tubercle, Lond., 46 : 188,  
1965.

### III

Aan de eis dat bij een endodontische behandeling het wortelkanaal precies ter plaatse van het foramen apicale moet worden afgesloten is niet te voldoen.

### IV

Bij de behandeling van de lijder aan hemophilie met een circulerend anticoagulans kan wisseltransfusie van betekenis zijn.

### V

Zonder goede gebitsverzorging is orthodontische behandeling zinloos.

### VI

Een starre verbinding tussen het verankerings- en het vervangingsdeel van een vrij eindigende partiele gebitsprothese verdient vaak de voorkeur boven een verbinding door middel van een drukkbreker.

### VII

Bij een toenemende stijfheid van beide kaakgewrichten bij jeugdige individuen mag een onderzoek naar de Z. v. Bechterew niet achterwege blijven.

## VIII

Aan de behandeling van een disto-relatie door middel van "jumping the bite" dient een onderzoek naar de toestand van beide kaakgewrichten vooraf te gaan.

## IX

Arthrosis deformans van het kaakgewricht bij jeugdige individuen, optredend tijdens de periode van snelle groei, is vergelijkbaar o.a. met de Z. v. Perthes van het heupgewricht.

## X

Jeugdzorg, jeugdontwikkeling en gezondheidszorg mogen per gemeente niet verschillen enkel en alleen op grond van de financiële positie, waarin de gemeente verkeert.

## XI

De annexatieplannen van de stad Groningen verdienen uit bestuurlijk en financieel oogpunt de voorkeur boven een regeling, zoals die werd getroffen in het Rijnmondgebied.

Stellingen, behorende bij

G. Boering - Arthrosis deformans van het kaakgewricht.

Groningen 1966.